



ASSOCIATIE MKA

Consultatie ZOL

Tel: 089/32 61 60
Email: Secretariaat.MKA@zol.be

Consultatie ZMK

Tel: 089/ 50 97 47
Email: mka@zmk.be

Consultatie Jaarbeurslaan

Tel: 089/ 51 50 50
Email: info@xentrojbl.be

Ziekenhuis Oost-Limburg Campus St. Jan

Dr. Luc Vrielinck
Dr. Serge Schepers
Dr. Sarah Van Slycke
Dr. Joeri Meyns
Dr. Guido Heijsters

Ziekenhuis Maas en Kempen Campus Bree

Dr. Sarah Van Slycke
Dr. Guido Heijsters
Dr. Serge Schepers

Privaatpraktijk Jaarbeurslaan

Dr. Luc Vrielinck
Dr. Serge Schepers
Dr. Joeri Meyns

POSTOPERATIEVE INSTRUCTIES NA EEN CYSTECTOMIE

Dank voor het gestelde vertrouwen bij uw mondheelkundige verzorging. Hetgeen volgt zijn een reeks raadgevingen en geruststellingen die u doorheen een comfortabele en vertrouwensvolle genezing zullen loodsen. Uw behandeling duurt tot een volledige genezing is bekomen. U bent dus altijd welkom.

De bedoeling van de uitgevoerde behandeling is eenvoudig.

In de eerste plaats zal het zieke infectieweefsel verwijderd worden. Dit zieke weefsel tast het kaakbeen aan en kan een bron zijn van druk, ongemak, pijn, fistelvorming en eventueel beschadiging van de buurtanden of kaakzenuw. Dit infectieweefsel neemt meestal de vorm aan van een cyste en bevindt zich gewoonlijk dicht bij de wortelpunt van de tand, zoals op de tekening te zien is. Deze wegname gebeurt langs een kleine insnede, waarvoor u plaatselijk verdoofd wordt zoals bij de tandarts.

In de tweede plaats zal ook getracht worden de oorzaak van deze infectie weg te nemen. De infectie in het kaakbeen wordt in de regel toegeschreven aan de aanwezigheid van microben in het wortelkanaal van de tand. Daarom wordt tevens een chemische én een mechanische reiniging van alle wortelkanalen van de tand uitgevoerd. Na reiniging wordt het wortelkanaal hermetisch afgesloten door een rubberen stift. Dit gebeurt ofwel tijdens de heelkundige ingreep of kort ervoor in een aparte zitting, afhankelijk van het soort tand. De toegang tot het wortelkanaal langs de tandkroon wordt afgesloten met een voorlopige vulling. Indien het onmogelijk is om langsheen de kroon het wortelkanaal te zuiveren, dan zal het wortelkanaal gereinigd en afgesloten worden langsheen het worteluiteinde van de tand. In dit geval wordt de kroon van de tand niet aangeboord. De wonde wordt gehecht met draadjes die ofwel vanzelf vergaan, meestal na 1 à 2 weken.

Van deze behandeling kunt u de volgende nabezwaren verwachten, welke op zich geen reden tot ongerustheid dienen te zijn:


Zwelling: Het optreden van een flinke dikke wang is te verwachten. Deze zwelling wordt het hevigst na de tweede of de vierde postoperatieve dag en begint nadien duidelijk af te nemen.

Suturen: De draadjes kunnen een vervelend en spannend gevoel veroorzaken. Dit is normaal en zal ophouden wanneer ze vanzelf opgelost zijn of wanneer ze verwijderd worden na 1 a 2 weken.

Napijn: Ongemak tot pijn is normaal. Medicatie zoals voorgeschreven is gewoonlijk zeer doeltreffend. Wacht niet tot de pijn in alle hevigheid is doorgebroken alvorens een pijnstiller te nemen.

Temperatuur: Lichte koorts is normaal de volgende dag. Rusten en veel drinken is dan geboden.

Nabloeden: De eerste 12 tot 24 uur is nabloeden mogelijk, met name wanneer de dag van de ingreep overvloedig wordt nagespoeld.



Wat zeker te doen:

VANDAAG:

- Neem pijnstillers alvorens de verdoving is uitgewerkt.
- Tong weghouden van de plaats van de ingreep.
- Een beschermd ijszakje op de wang houden gedurende 2 à 6 uur na de ingreep.
- Veel rusten.
- Eten en drinken is niet beperkt, maar kan wat moeilijkheden opleveren.
- Bij voorkeur wordt gekozen voor lauw tot koud vloeibaar of zacht voedsel.
- Wacht echter met eten en drinken tot de verdoving is uitgewerkt.

VOLGENDE DAGEN:

- Na 24 uur de mond spoelen met lauw zout water (1 koffielepel zout in één tas lauw water) of mondspoelmiddel.
- Neem pijnstillers en antibiotica zoals voorgeschreven.
- Schoonhouden van de mond is essentieel. Tandens poetsen moet normaal verder gebeuren, eventueel met een kleine, zachte kindertandenborstel.
- Veel rust en een goede voeding bevorderen uw genezing.

Wat zeker niet te doen:

- Eerste 24 uur niet spoelen en niet zuigen op de wonde. Dit veroorzaakt afbraak van de bloedklonter en leidt tot nabloeden.
- Geen hete koffie, thee of hete spijzen in de eerste 24 uur.
- Gedurende de eerste 5 dagen niet roken en geen alcohol benutten.

Meestal is de behandelde tand voorzien van een witte noodvulling, die na genezing van de wonde door uw eigen tandarts moet vervangen worden door een definitieve vulling (2 weken).

Wanneer onverwacht toch nog problemen ontstaan, waarover u zich zorgen maakt, verzoeken we u ons rechtstreeks telefonisch te contacteren op het volgend telefoonnummer:

Tijdens de kantooruren: 089/32 61 61 en buiten de kantooruren: 089/32 58 20.

Buiten de diensturen (08.00 ó 18.00 u) en gedurende het weekend zijn we onrechtstreeks bereikbaar via de spoedgevallendienst van het ziekenhuis: 089/32 51 40 of 089/32 51 20.

Wij hopen u hiermee van nut geweest te zijn en wensen u van harte een vlot herstel!